



附 图 说 明

1. 巨大短咽吸虫 *Brachylaima gigas* 新种
2. 四川毛细线虫 *Capillaria sichuanensis* 新种
 (1. 雌虫头部 2. 雄虫尾部 3. 雄虫体末端 4. 雌虫尾部 5. 阴户 6. 食道细胞
 7. 虫卵)
3. 文氏管状线虫 *Syphacia venteli* Travassos, 1937
 (1. 雌虫体前部 2. 雄虫侧面 3. 雄虫尾部腹面 4. 雌虫尾部侧面)

四川鹤类 — 新纪录

李桂垣 张清茂 崔学振 曾继恒
 (四川农业大学) (宝兴县林业局)

1986年4月10日,宝兴县永富乡农民徐志清和石成禄,在巴斯沟海拔1470米处的沟旁灌丛捕得一只步履艰难的鹤类,经我们鉴定为蓑羽鹤 *Anthropoides virgo* (Linnaeus) 的雌性成鸟。

形态 头和颈部除头顶、颈和后颈羽毛呈灰色外,其余概黑色;眼后具一束修长丝状白羽,向后延伸超过头部。前颈黑羽延长,呈披针形,向下覆盖胸部,状若蓑衣罩身,故名蓑羽鹤。翅上小翼羽、大覆羽和飞羽黑褐色;内侧次级飞羽灰色,具黑色羽端,向后延伸呈长矛形。尾羽灰色。其余体羽概灰白色。

虹膜红褐色,嘴淡绿,末端红色;跗蹠和趾黑色。

量衡度(克或毫米):体重1125,全长754,翅460,嘴峰60,尾150,跗蹠165。

蓑羽鹤在我国产九种鹤类中,是体型较小的一种,因姿态秀丽而文静可爱,象古代闺房中的少女,故曾有“闺秀鹤”的美称,常被动物园饲养供陈列观赏。

据文献报道,蓑羽鹤在国内的分布,以往仅见于东北、内蒙古、宁夏、新疆、河北、青海和西藏等省、区,此次在宝兴的发现,是四川鸟类的新纪录。截至目前,四川的鹤科鸟类共有灰鹤、黑颈鹤和蓑羽鹤三种,因而,四川鸟类的种数,总计应为598种(730种与亚种)。